

Fauna Representativa

Una de las características del Complejo Lagunar de La Albuera es su temporalidad: en épocas de fuerte estiaje o sequía, las lagunas quedarán sin agua, lo que permite que se desarrollen distintas especies, según la época del año en la que estemos.



Se puede diferenciar entre:

- Especies sedentarias
- Especies invernantes
- Especies estivales
- Especies accidentales

FAUNA POR HÁBITAT Y TEMPORALIDAD

FAUNA REPRESENTATIVA DE LAS LAGUNAS (cuando tienen agua)

Especies reproductoras. Charrancito, fumarel cariblanco, avefría, cigüeñuela, chorlito chico, ánade real... entre las aves. Entre los invertebrados conviene citar al *Triops cancrivorus*, *Branchipus navasii*, *Cyzicus cortesi*, que son crustáceos antediluvianos (se estima que llevan en la Tierra desde hace 250 millones de años, es decir, antes de la era de los dinosaurios).

Especies invernantes. Grullas, combatientes, correlimos comunes y menudos, andarrios chico, grande y bastardo, avefrías, cigüeñuelas, avocetas, gaviotas reidoras y sombrías y rapaces como el esmerejón, el halcón peregrino o el aguilucho lagunero. Es importante la concentración de anátidas como el pato cuchara, el ánade silbón o el friso, la cerceta común, el porrón común o en mucho mayor número, el ánade real.

FAUNA DE LAS DEHESAS Y MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS

Especies reproductoras. Elanio azul, cernícalo vulgar, ratonero común y mochuelo entre las rapaces. También aparece la tórtola común, la paloma torcaz, el rabilargo, la urraca y la perdiz.

FAUNA REPRESENTATIVA DE LAS ZONAS SUBESTÉPICAS Y ESTEPAS SALINAS (también sería la fauna de las lagunas cuando no tienen agua)

Especies reproductoras. Avutarda, sisón, canastera, carraca, alcaraván, cogujada común, alondra, terrera y aguilucho cenizo. Especies invernantes. Grulla, chorlito dorado, milano real, halcón peregrino, esmerejón y aguilucho pálido.

